



## KÜLTÜREL ÖNLEMLER

- Kestane işleme evlerinde ve bahçede ayrılan kurtlu meyveler imha edilmelidir.
- Gümü yerleri özellikle haziran ayında sık sık çapalanmalı ve çıkan kurtlar imha edilmelidir.
- Gömülerde bulunan ürünlerdeki kurtların hepsinin toprağa inmesi için hasat ile satış arasında 1.5 - 2 ay gibi bir süre bırakılmalıdır.
- Kestane işleme evlerinin tabanının beton ve duvarlarının iyi sıvanmış olmalıdır. Ayrıca satış için getirilen kestane cuvalleri beton zemine konmalıdır.



Ayrıntılı Bilgi için;

İl ve İlçe Müdürlüklerimize Başvurunuz.  
Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  
Tel: 0 256 211 30 00  
[www.aydintarim.gov.tr](http://www.aydintarim.gov.tr)



## KESTANE İÇ KURLARI



GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
AYDIN İL MÜDÜRLÜĞÜ

0 256 211 30 00

[www.aydintarim.gov.tr](http://www.aydintarim.gov.tr)



## ZARARLILARIN TANIMI

### Kestane hortumlu böceği (*Curculio elephas*) :

Erginleri gri-sarı ve kırmızımtrak renkli hortumlu böceklerdir. Larvası ise krem - beyaz renkli olup 7-12 mm büyüklüğe erişebilirler. Dişiler yılda 40 - 50 yumurta bırakabilirler.



### Kestane İç Kurdu (*Cydia splendana*) :

Erginleri gri ve gri kahverenkli kelebeklerdir. Larvaları genellikle beyaz veya pembe beyaz renkte olup 12-17 mm uzunluğa ulaşabilir. Bir dişi 300-600 yumurta bırakabilir.




## ZARARI

Her iki zararlıda doğrudan kestane meyveleri ile beslenip zararlı olurlar. Zararlılar meyve içinde galeri açarak beslenirler ve bu esnada pislik çıkarırlar.

Zararlılar aynı aynı meyvelerde beslenebildiği gibi, aynı meyve içindedey beslenebilirler. Hasat zamanı bir delik açarak meyveyi terk ederler. Bu durum kademeli olarak gömü esnasında da 1.5 - 2 ay boyunca devam eder. Zarara uğrayan meyveler pazar

değerini tamamen kaybeder. Her iki zararlıya ait erginler ağustos başında görülürler. Çiftleştikten sonra yumurtalarını bırakmaya başlarlar. Bu durum ekim ayı başına kadar sürebilir.



## KİMYASAL MÜCADELE

Ürün gömüye konmadan hemen önce gömü yeri toprağı ilaçlanmalıdır. Ayrıca bundan 20-25 gün sonra gömüdeki yığılı nemlendirilirken nemlendirme suyu ile ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır.

**NOT:** Kullanılacak ilaçlar, uygulama tekniği ve detaylı bilgi için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğüne başvurunuz.